



Overxicam gel equinos

La evolución en
terapia antiinflamatoria



over[®]
MEDICINA VETERINARIA

Efectividad de amplio espectro



ANTIPIRÉTICO

Overxicam Gel Equinos combate el proceso febril en forma duradera.

ANTIENDOTÓXICO

Overxicam Gel Equinos neutraliza la acción de las endotoxinas a nivel local y sistémico.

ANALGÉSICO

Overxicam Gel Equinos bloquea la síntesis de mediadores químicos del dolor eliminándolo rápidamente.

ANTIINFLAMATORIO


Overxicam Gel Equinos controla en forma rápida y prolongada el proceso antiinflamatorio.

La fórmula de Overxicam Gel Equinos combina un principio activo de probada eficacia analgésica y antiinflamatoria con agentes saborizantes que facilitan su administración oral, convirtiéndolo en un producto de elección para el tratamiento de la inflamación en trastornos locomotores y el alivio del dolor asociado al cólico.

Overxicam Gel Equinos contiene meloxicam, un antiinflamatorio no esteroide (AINE) perteneciente al grupo de los oxicam, derivado de los ácidos enólicos. El meloxicam ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antipiréticas y antiendotóxicas.

Mecanismo de acción de Overxicam gel equinos

Inhibición de la síntesis de las prostaglandinas



Ventajas de Overxicam gel equinos

1.

Contiene un agente antiinflamatorio de última generación y **COX - 2** selectivo.

2.

Indicado para el tratamiento de la inflamación articular.

3.

Alivia el dolor asociado al cólico.

4.

Mejora la tasa de recuperación después del ejercicio extenuante.

5.

Seguro y eficaz para utilizar en potrillos.

6.

Rápida eliminación.

7.

Sabor manzana. Alta palatabilidad.

Overxicam gel equinos

DESCRIPCIÓN:

Antiinflamatorio no esteroide de uso oral para equinos.

FÓRMULA:

Cada 100 g contiene:

Meloxicam 4,5 g

Agentes de formulación.....c.s.p

INDICACIONES DE USO:

Esta indicado para aliviar el dolor y la inflamación en trastornos locomotores y musculoesqueléticos agudos y crónicos; dolor asociado a cólicos; analgesia pre y post quirúrgica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

El producto se administra vía oral.

DOSIFICACIÓN:

Administrar 1 medida (6 g cada 450 kg) por día. Esto equivale a 0,6 mg de meloxicam por kilogramo de peso vivo.

Se recomienda administrar por un período de 5 días dependiendo de la afección a tratar. En patologías crónicas el período de tratamiento puede extenderse hasta un máximo de 14 días.

PRESENTACIÓN: Jeringa de 30 gr.

over[®]

MEDICINA VETERINARIA

Alfonsina Storni 680 (S2447)
San Vicente, Pcia. de Santa Fe,
República Argentina.

T: +54 (3492) 470 696 | 086 | 138
F: +54 (3492) 470 196
M: labover@over.com.ar



www.over.com.ar